


Всеукраїнська громадська наукова організація “Українська академія наук”
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

МЕДИЧНА ХІМІЯ

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ



*All-Ukrainian Public Scientific Organization
“Ukrainian Academy of Sciences”
SHEI “I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University MPH of Ukraine”*

MEDICAL CHEMISTRY

SCIENTIFIC JOURNAL

3(56) ТОМ 15
2013

- ❖ **Молекулярні механізми розвитку патології**
- ❖ **Біохімія у діагностиці та лікуванні**
- ❖ **Біохімія серцево-судинних хвороб**
- ❖ **Біохімічна гепатологія та нефрологія**
- ❖ **Біохімія ендокринних хвороб**
- ❖ **Патохімія спадкових хвороб**
- ❖ **Патохімія екстремальних станів**
- ❖ **Біохімія в хірургічній клініці**
- ❖ **Нейрохімія та патохімія головного мозку**
- ❖ **Імунохімія**
- ❖ **Біохімія радіаційних уражень**
- ❖ **Біохімічні аспекти моделювання патологічних процесів**
- ❖ **Ксенобіохімія**
- ❖ **Методи біохімічних досліджень**
- ❖ **Історія біохімії**
- ❖ **Проблеми і досвід викладання біологічної та медичної хімії**
- ❖ **Інформація, хроніка, ювілеї**

- ❖ **Molecular Mechanisms of Pathology Development**
- ❖ **Biochemistry in Diagnostics and Treatment**
- ❖ **Biochemistry of Cardiovascular Diseases**
- ❖ **Biochemical Hepatology and Nephrology**
- ❖ **Biochemistry of Endocrinopathy**
- ❖ **Pathochemistry of Hereditary Diseases**
- ❖ **Pathochemistry of Extremal States**
- ❖ **Biochemistry in Surgical Clinics**
- ❖ **Neurochemistry and Pathochemistry of Cerebrum**
- ❖ **Immunochemistry**
- ❖ **Biochemistry of Radiation Injuries**
- ❖ **Biochemical Aspects of Simulation of Pathologic Processes**
- ❖ **Xenobiochemistry**
- ❖ **Methods of Biochemical Investigations**
- ❖ **History of Biochemistry**
- ❖ **Problems and Experience of Biological and Medical Chemistry Teaching**
- ❖ **Information, Chronicle, Jubilees**

МЕДИЧНА ХІМІЯ

Науковий журнал

MEDICAL CHEMISTRY

Scientific Journal

ISSN 1681-2557

Виходить щоквартально
Published 4 times per year

Заснований у грудні 1999 року
Founded in December 1999

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 3647 від 26.01.1999 р.
Certificate of state registration:
series KB № 3647 from 26.01.1999

Передплатний індекс: 22869
Subscription index: 22869

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р. журнал "Медична хімія" внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних і біологічних наук. Журнал включене до Міжнародної наукометричної бази Google Scholar.

Журнал "Медична хімія" акредитований науково-видавничою радою Президії АМН України (лист № 02-17/1341 від 25.10.2001 р.).

Рекомендовано до видання вченуою радою ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол № 17 від 4 червня 2013 р.).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Журнал "Медична хімія"
Видавництво "Укрмедкнига"
Майдан Волі, 1
46001, м. Тернопіль
УКРАЇНА

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Journal "Medical Chemistry"
Publishing House "Ukrmedknyga"
Maidan Voli, 1
46001, Ternopil
UKRAINE

Tel.: (0352) 43-49-56
(0352) 52-80-09
Fax: (0352) 52-41-83
<http://www.tdmu.edu.te.ua>

За зміст рекламних матеріалів відповідальність несе рекламодавець.
При передруці або відтворенні повністю чи частково матеріалів журналу "Медична хімія" посилання на журнал обов'язкове.

© Науковий журнал "Медична хімія", 2013
© Scientific Journal "Medical Chemistry", 2013

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- Ваврух П. О., Боднар Я. Я., Ваврух Г. П. (Тернопіль) ДИНАМІКА ІНТЕГРАЛЬНИХ МАРКЕРІВ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ, СПРИЧИНЕННОЇ ВВЕДЕННЯМ ЦИТОСТАТИКІВ 5
- Швець В. М. (Запоріжжя) ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД, ГОМОГЕНАТУ СЕРЦЯ ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ЩУРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО МОДУЛЯЦІЇ ПРИ СТРЕСІ 10
- Федєвич Ю. М. (Львів) ВПЛИВ ГАПТОГЛОБІНУ НА КІСНЕЗВ'ЯЗУВАЛЬНІ ТА НІТРИТРЕДУКТАЗНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОГЛОБІНУ 15
- Кулініч О. С., Дьомшина О. О., Штеменко Н. І. (Дніпропетровськ) МОДУЛЯЦІЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ЦІСІЛТАТИНУ КЛАСТЕРНИМИ СПОЛУКАМИ РЕНІЮ(ІІІ) У МОДЕЛІ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ 21
- Мисула І. Р., Суховолець І. О. (Тернопіль) ПЕРЕБІГ ПАРОДОНТИТУ ПРИ ГІПОЕРГЧНОМУ ТА ГІПЕРЕРГЧНОМУ ТИПАХ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ НА ФОНІ АДРЕНАЛІНОВОЇ МІОКАРДІОПАТІЇ 27
- Борис Р. М. (Одеса) ДИНАМІКА ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ЛАНКИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД ГОСТРОЇ РЕАКЦІЇ НА ПОЄДНАНУ КРАНІОСКЕЛЕТНУ ТРАВМУ 31
- Павлишин Г. А., Козак К. В. (Тернопіль) ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІNU В ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯМ 36
- Вовк Т. Б. (Київ) ВПЛИВ Ig G ХВОРІХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК НА ПОКАЗНИКИ ХРОНОМЕТРИЧНИХ ТЕСТІВ 40
- Яковлєва Л. В., Чорна Н. С., Бабенко Д. М. (Харків) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ ЧЕРЕЗ 1 І ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ ВІД ПОЧАТКУ ІНДУКЦІЇ ІНСУЛІНЗАЛЕЖНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ЛІСТЯ БЕРЕЗИ БОРОДАВЧАСТОЇ НА ЇЇ ПРОГРЕСУВАННЯ 44
- Пида В. П. (Тернопіль) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТО-ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З БРУНЬОК ОБЛІПІХИ КРУШИНОПОДІБНОЇ НА МОДЕЛІ ТЕТРАЦІКЛІНОВОГО ГЕПАТИТУ 48
- Яковлєва Л. В., Стефанів І. В. (Харків, Тернопіль) ВИВЧЕННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ НАСТОЯНКИ "КАСДЕНТ" НА МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГІНГІВІТУ В ЩУРІВ 52
- Глушко К. Т. (Тернопіль) ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ НА ФОНІ ТОКСОКАРОЗУ 55
- Семенів Д. В. (Івано-Франківськ) ДОСЛІДЖЕННЯ КАРДІОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУБСТАНЦІЇ АРОНІЇ ГІДРОФІЛЬНОЇ НА МОДЕЛІ АДРЕНАЛІНОВОГО МІОКАРДИТУ В ЩУРІВ 59

Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

- Vavrukha P. O., Bodnar Ya. Ya., Vavrukha H. P. (Ternopil) DYNAMICS OF INTEGRAL MARKERS OF ENDOGENOUS INTOXICATION CAUSED BY INTRODUCTION OF CYTOSTATICS 5
- Shvets V. M. (Zaporizhzhia) PHOSPHOLIPID COMPOSITION OF THE HEART HOMOGENATE OF THE ADULT AND OLD RATS, AND PECULIARITIES OF ITS MODULATION UNDER STRESS 10
- Fedevych Yu. M. (Lviv) INFLUENCE OF HAPTOGLOBIN ON OXYGEN-BINDING AND NITRITE REDUCTASE CAPACITIES OF HEMOGLOBIN 15
- Kulinich O. S., Dyomshyna O. O., Shtemenko N. I. (Dnipropetrovsk) MODULATION OF CISPLATIN HEPATOTOXICITY USING CLUSTER COMPOUNDS OF RHENIUM(III) IN A MODEL OF CARCINOGENESIS 21
- Mysula I. R., Sukhovolets I. O. (Ternopil) COURSE OF PARODONTITIS, COMBINED WITH ADRENALINE MIOCARDIOPATHY, AT HYPOERGIC AND HYPERERGIC TYPES OF INFLAMMATORY REACTION 27
- Borys R. M. (Odesa) THE DYNAMICS OF ENZYMATIC BRANCH OF ANTIOXIDANT PROTECTION DURING AN ACUTE REACTION TO A COMBINED CRANIO-SKELETAL TRAUMA 31
- Pavlyshyn H. A., Kozak K. V. (Ternopil) EVALUATION OF CARBOHYDRATE METABOLISM IN CHILDREN WITH OVERWEIGHT AND OBESITY 36
- Vovk T. B. (Kyiv) Ig G INFLUENCE OF PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS ON INFLUENCE BLOOD CLOTTING TESTS 40
- Yakovleva L. V., Chorna N. S., Babenko D. M. (Kharkiv) THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE DEVELOPMENT OF DIABETIC NEPHROPATHY AFTER 1 AND 3 MONTH FROM THE BEGINNING OF INDUCTION OF INSULINE-DEPENDENT DIABETES AND IMPACT OF THE DENSE EXTRACT FROM LEAVES OF THE SILVER BIRCH AT ITS PROGRESSION 44
- Pyda V. P. (Ternopil) RESEARCH OF LIVERPROTECTIVE PROPERTIES OF THE THICK EXTRACT FROM BUDS OF SEA-BUCKTHORN ON A MODEL OF TETRACYCLINE HEPATITIS 48
- Yakovleva L. V., Stefaniv I. V. (Kharkiv, Ternopil) THE STUDY OF SPECIFIC PHARMACOLOGICAL EFFECT OF TINCTURE "KASDENT" ON THE MODEL OF EXPERIMENTAL GINGIVITIS IN RATS 52
- Glushko K. T. (Ternopil) IMMUNOLOGICAL FEATURES OF CHRONIC DIGESTIVE PATHOLOGY AMONG CHILDREN WITH TOXOCARIASIS 55
- Semeniv D. V. (Ivano-Frankivsk) INVESTIGATIONS OF CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES OF CHOKEBERRY'S HYDROPHILIC SUBSTANCE TO THE MODELS OF RATS' ADRENALINE MYOCARDITIS 59

**ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ**

*Сиротинська І. Д. (Івано-Франківськ) ДОСВІД
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ
ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ
СТУДЕНТІВ*

ОГЛЯД

*Палиця Л. М., Ястремська С. О., Корда М. М.
(Тернопіль) ТОКСИЧНІСТЬ ФУЛЕРЕНІВ: ОЦІНКА
РІЗИКУ ЇХ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ*

**PROBLEMS OF BIOLOGICAL
CHEMISTRY TEACHING**

*Syrotynska I. D. (Ivano-Frankivsk) THE EXPERIENCE
OF APPLYING OF ALTERNATIVE FORMS OF THE
LECTURES FOR FOREIGN STUDENTS*

64

REVIEW

*Palytsa L. M., Yastremska S. O., Korda M. M. (Ternopil)
TOXICITY FULLERENES: RISK ASSESSMENT THEIR
IMPACT ON HUMAN HEALTH*

67

МОДУЛЯЦІЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ЦИСПЛАТИНУ КЛАСТЕРНИМИ СПОЛУКАМИ РЕНІЮ(ІІ) У МОДЕЛІ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ

Введення сполуки ренію з ізобутиратними лігандами, розташованими в цис- положенні навколо почверного зв'язку, призводило до гальмування процесів цитолізу клітин печінки та зниження активності ферментативних процесів тканин печінки в моделі канцерогенезу та за умов введення цисплатину. Сполука $\text{Re}_{\text{cisobut}}$ проявила більш ефективні властивості до модуляції гепатотоксичної дії цисплатину, ніж аналогічна сполука ренію з адамантильними лігандами. Вперше вивчено вміст відновленого глутатіону в клітинах печінки та плазмі крові щурів-пухлиноносіїв при введенні системи реній–платина і запропоновано приблизну схему, що пояснює можливу роль глутатіонової системи у прояві гепатопротекторних властивостей сполук з почверним зв'язком.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: **модуляція, гепатотоксичність, цисплатин, кластерні сполуки ренію(ІІІ).**

ВСТУП. У наших попередніх роботах [2] показано гепатопротекторні властивості кластерних сполук ренію(ІІІ) з органічними лігандами (КРОЛ) у моделях канцерогенезу та токсичного гепатиту. Було випробувано КРОЛ тетракарбоксилатного, тетрафосфатного та цис-дикарбоксилатного типів. У ряді сполук КРОЛ структурного типу цис-дикарбоксилатів визначено сполуку з адамантильними лігандами, що проявляла надзвичайно значні гепатопротекторні властивості, що пояснювалось саме властивостями каркасних лігандів стероїдного типу. Проте існує й інша точка зору щодо пояснення цього явища – унікальні властивості почверного зв'язку як пастки радикалів, які виявляють *in vivo* незалежно або разом із властивостями органічного радикала. Отже, пошук гепатопротекторів у ряді цис-дикарбоксилатів є перспективним напрямком досліджень. Відомо, що система глутатіонового захисту є однією з найважливіших стратегій зневаждження небезпечних радикальних вибухів [6, 13, 23], що супроводжують цисплатинову терапію і канцерогенну дію в печінці [10, 12, 15–18, 24, 26]. Глутатіонову антиоксидантну ланку в печінці не досліджували у моделі канцерогенезу та при застосуванні протипухлинної системи реній–платина (система Re–Pt).

Отже, метою роботи було вивчити можливий гепатопротекторний вплив кластерної сполуки ренію цис-дикарбоксилатного ряду з

© О. С. Кулініч, О. О. Дьомшина, Н. І. Штеменко, 2013.

ізобутирильними лігандами при використанні системи Re–Pt у моделі канцерогенезу щурів та з'ясувати питання про участь даної системи в механізмі гепатопротекції.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Вивчали сполуку цис-діізобутиратодиреній(ІІІ)-тетрахлорид – ($\text{Re}_{\text{cisisobut}}$) – цис $\text{Re}_2(\text{iC}_3\text{H}_7\text{COO})_2\text{Cl}_4$, синтезовану на кафедрі неорганічної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ, Україна) [5].

Експеримент з вивчення протипухлинної активності КРОЛ проводили на щурах лінії Вістар масою 100–150 г, яких утримували в стандартних умовах віварію. Маніпуляції зі щурами виконували відповідно до правил Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (м. Страсбург, 1986). Карцинома Герена Т8 – типова епітеліальна солідна пухлина з ефективністю перевивання у 75 % та без випадків спонтанного розсмоктування. Чутливість цієї пухлини до відомих протипухлинних засобів дозволяє використовувати її при доборі та випробуванні нових хіміотерапевтичних агентів. Донорами ракових клітин були щури-пухлиноносії, яких придбали в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України безпосередньо до трансплантації. Донора з двотижневою пухлиною (діаметром 40–45 мм) забивали, вилучали пухлину. Транс-

плантацію карциноми Герена Т8 здійснювали методом підшкірного введення в ділянку стегна задньої кінцівки 0,5 мл 20 % суспензії клітин пухлини у фізіологічному розчині. Цисплатин (cPt) вводили одноразово у дозі 8 мг/кг на 9 добу після трансплантації пухлини. Сполуки ренію вводили за схемою антиоксидантної терапії 10 разів, починаючи з 3 доби після перевивання пухлини з інтервалом в 1 добу, в кількості 7 мкмоль/кг маси тварини, як описано в [4].

Тварин було поділено на п'ять груп (по 15 щурів у кожній): 1-ша – інтактні тварини (контроль); 2-га – тварини з карциномою Герена Т8; 3-тя – тварини з карциномою Герена Т8, яким вводили цисплатин у вигляді розчину за схемою [22]; 4-та – тварини з карциномою Герена Т8, яким вводили систему Re–Pt як одноразове введення цисплатину в дозі 8 мг/кг на 9 добу та сполук ренію в наноліпосомній формі, починаючи з 3 доби після трансплантації ракових клітин з інтервалом в 1 добу протягом 21 доби, у дозі 7 мкг/кг з кінцевим молярним співвідношенням введених сполук ренію і платини 4:1 (Re+cPt) за схемою антиоксидантної терапії (способ 2) [21] ($[Re_{cisobutyl}nl + cPt]$); 5-та – тварини з карциномою Герена Т8, яким вводили систему Re–Pt, щурам-пухлиноносіям вводили також у вигляді змішаних наноліпосом (nl) розміром 10–100 нм, навантажених цисплатином та сполукою ренію у співвідношенні компонентів 4:1 (способ 3) ($[Re_{cisobutyl} + cPt] nl 4:1$). Систему Re–Pt вводили внутрішньочеревно на 3 день після трансплантації пухлини з розрахунку 7 мкмоль/кг ренієвої сполуки десятикратно. На 21 день після трансплантації пухлини щурів декапітували під етерним наркозом.

Функцію печінки визначали за змінами активності аланінаміотрансферази (АлАТ), аспартатаміотрансферази (АсАТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної фосфатази (ЛФ) і гамма-глутамілтрансферази (ГГТ) з викорис-

танням стандартних лабораторних методик тест-наборів (“Реагент”, Україна, м. Дніпропетровськ) за методами [7, 19].

Рівень малонового діальдегіду (МДА) в плазмі та гомогенаті печінки визначали за методикою [1], глутатіону (GSH) – за [11].

Статистичний аналіз отриманих даних проводили в Microsoft Excel із визначенням імовірних відмінностей з використанням t-крите-рію Стьюдента [3].

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Як розвиток новоутворення, так і введення cPt викликали явище гіперферментемії, тобто збільшення активності ферментів, як у плазмі крові, так і в тканині печінки (табл. 1).

Відомо, що під дією токсичних факторів, якими є канцерогенез та cPt, відбувається спочатку активація процесів трансамінування, фосфорилювання, окиснення–відновлення тощо в клітинах печінки, а потім їх цитоліз із наступним вивільненням ферментів у кров [2, 12, 17, 26]. Найбільш чутливими до токсичних речовин є процеси трансамінування, про що свідчить суттєве зростання АлАТ і АсАТ у плазмі крові щурів-пухлиноносіїв. Слід відмітити, що введення сполуки Re_{cisobutyl} у ліпосомній формі на фоні введення cPt знижувало як активацію біохімічних процесів у тканині печінки, так і цитолітичні процеси. Останнє можна пояснити мембраностабілізуючою та антиоксидантною властивостями КРОЛ завдяки наявності в їх структурі почверного зв'язку [21]. Така властивість Re_{cisobutyl} за своїми параметрами перевищує властивість свого попередньо вивченого аналога з адамантильними радикалами, особливо це стосується процесів вивільнення ЛДГ і ГГТ, рівень яких у плазмі крові зменшується набагато нижче контролю. Слід також відмітити, що введення Re_{cisobutyl} більш вибірково впливає на активацію біохімічних процесів у тканині печінки (дані ферментативної активності у гомогенаті тканини). Особливо це

Таблиця 1 – Активність ферментів у плазмі крові й печінці щурів, % до контролю

Група	АлАТ, %		АсАТ, %		ГГТ, %		ЛДГ, %		ЛФ, %	
	плазма	гомо-генат	плазма	гомо-генат	плазма	гомо-генат	плазма	гомо-генат	плазма	гомо-генат
T8 (2-га група)	156*	246*	233*	312*	66*	150*	166*	127*	166*	72*
T8+cPt (3-тя група)	242*	346*	248*	404*	118*	167*	505*	350*	188*	843*
T8+[Re _{cisobutyl}]nl+cPt] (4-та група)	69#	153#	122#	235#	15#	60#	118#	82#	18#	331#
T8+[Re _{cisobutyl} +cPt]nl4:1 (5-та група)	80#	97#	93#	206#	4#	33#	83#	98#	14#	306#

Примітки. Тут і в наступних таблицях:

1) * – достовірна різниця порівняно з контролем ($p < 0,05$);

2) # – достовірна різниця порівняно з групою T8+cPt ($p < 0,05$).

стосується активності ГГТ, рівень якої знижується більше ніж у 4 рази. Оскільки ГГТ є ферментом глутатіонового циклу [9, 25], слід припустити, що дана сполука проявляє унікальні антиоксидантні властивості та впливає на процеси, пов’язані з біосинтезом глутатіону.

Введення наноліпосом змішаного складу, де цисплатин перебував у ліпосомній формі, теж призводило до гальмування процесів цитолізу клітин печінки та вибірково процесів активації ферментів тканин печінки. Такий спосіб введення протипухлинної системи реній–платина з Re_{cisisobyt} також сприяв активному гальмуванню активності ГГТ, що було підтверджено розглянути здатністю цієї сполуки до гальмування процесу пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) (табл. 2).

Розвиток новоутворення викликає значне підвищення (майже в 7 разів) інтенсивності процесу ПОЛ. Введення цисплатину, незважаючи на гальмування росту пухлини, також сприяло інтенсивності процесу порушення мембрани печінки, що вважають однією з причин гепатотоксичності cPt [2, 8, 14, 20].

Введення щурам-пухлиноносіям сполуки Re_{cisisob} різними способами гальмувало процес ПОЛ – у 13–16 разів у плазмі крові й у 2–2,5 раза у тканині печінки порівняно з тваринами 3-ї групи, яким вводили cPt. Це набагато перевищувало властивості сполуки з адамантильними радикалами, для якої ці параметри складали 4 та 1,2–1,3 відповідно [2]. Отже, заміна адамантильного ліганду на ізобутиратний у молекулі КРОЛ призводить до більш суттєвого гепатопротекторного ефекту щодо гасіння радикального процесу ПОЛ.


У таблиці 3 наведено рівні глутатіону в дослідженіх тканинах.

Як і слід було очікувати, введення Re_{cisisobyt} обома способами підвищувало рівень глутатіону як у плазмі крові, так і в тканині печінки


порівняно з цисплатиновою групою. Проте таке підвищення не досягало рівня контролюючої групи.

Оскільки рівень глутатіону в тканині печінки досліджують уперше при застосуванні системи Re–Pt, не можна говорити про закономірності впливу почверного зв’язку на механізм дії глутатіонової системи печінки щурів. Проте ці дані дають нам можливість припустити такий каскад біохімічних реакцій у клітинах печінки з участю Re_{cisisobyt}.

Супероксид-аніон O₂⁻ (активна форма кисню) бере участь в оксидативному стресі й активно перетворюється супероксиддисмутазою у пероксид водню та воду:



Пероксид водню розщеплюється каталазою:



або глутатіонпероксидазою



Тобто в клітинах печінки існує 2 шляхи для знешкодження пероксиду водню. Імовірно, сполука Re_{cisisobyt} взаємодіє з радикалами за типом супероксиддисмутазної, каталазної реакцій (1), (2) або й раніше із супероксид-аніоном O₂⁻. Внаслідок цього реакція (3) гальмується субстратно – відсутністю пероксиду водню і глутатіон може здійснювати більш ефективну детоксикацію cPt, утворюючи кон’югат:



Отже, гальмування пероксидного стресу сполукою ренію призводить до більш інтенсивної детоксикаційної функції печінки пухлиноносіїв шляхом вивільнення глутатіону з глутатіонпероксидазної реакції.

Водночас гамма-глутаміловий цикл теж отримує додатковий субстрат (рис.).

ГГТ – єдиний відомий фермент, що розщеплює глутатіон і глутатіонові кон’югати. Активний центр ферменту міститься на зовнішній

Таблиця 2 – Рівень ТБК-активних продуктів плазми і гомогенату печінки щурів

Група	МДА в плазмі, ммоль/мл	МДА в печінці, ммоль/г
Контроль (1-ша група)	0,419±2,08	1,375±2,67
T8 (2-га група)	2,708±5,51*	2,500±5,05*
T8+cPt (3-тя група)	2,291±1,89*	1,750±2,12*
T8+[Re _{cisisobyt}]n+cPt (4-та група)	0,143±0,005#	0,932±1,97#
T8+[Re _{cisisobyt} +cPt4:1]nl (5-та група)	0,178±0,08#	0,754±1,24#

Таблиця 3 – Кількість відновленого глутатіону в плазмі й гомогенаті печінки щурів

Група	GSH у плазмі, мкмоль/л	GSH у печінці, мкмоль/кг
Контроль (1-ша група)	0,560±0,13	0,780±0,23
T8 (2-га група)	0,081±0,036*	0,068±0,004*
T8+cisPt (3-тя група)	0,212±0,095*	0,156±0,007*
T8+[Re _{cisisobyt}]nl+cPt (4-та група)	0,231±0,028#	0,135±0,048#
T8+[Re _{cisisobyt} +cPt4:1]nl (5-та група)	0,229±0,072#	0,209±0,066#




Рис. Гамма-глутаміловий цикл за [13] (скорочено).

мембрани клітини й активується завдяки збільшенню концентрації глутатіону, що відбувається внаслідок гальмування реакції (3). Водночас збільшується концентрація глутатіону в зовнішньоклітинному просторі, що ми спостерігаємо в експерименті при дослідженні рівня глутатіону в плазмі крові. Запропоновані нами схема пояснює зниження активності ГГТ та концентрації глутатіону впливом Re, проте є гіпотетичною та вимагає додаткових досліджень.

ВИСНОВКИ. Введення сполуки ренію з ізобутиратними лігандами, розташованими в цис-положенні навколо почверного зв'язку, призводило до гальмування процесів цитолізу клітин печінки та зниження активації фермен-

тативних процесів тканин печінки у моделі канцерогенезу та за умов введення цисплатину. Саме сполука Re_{cisisobut} проявила більш ефективні властивості до модуляції гепатотоксичної дії цисплатину, ніж аналогічна сполука ренію з адамантильними лігандами. Вперше вивчено вміст відновленого глутатіону в клітинах печінки та плазмі крові шурів-пухлиноносіїв при введенні системи реній-платина та запропоновано приблизну схему, що пояснює можливу роль глутатіонової системи у гепатопротекторній функції сполук з почверним зв'язком. Сполуки ренію з почверним зв'язком є перспективними речовинами для медичної практики, які можна використовувати для гальмування радикальних вибухів у клітинах при різних патологічних станах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреева Л. И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой / Л. И. Андреева // Лаб. дело. – 1988. – 2. – С. 41–43.
2. Івчук В. В. Вплив протипухлинної системи реній–платина на біохімічний стан печінки / В. В. Івчук // Укр. біохім. журн. – 2011. – № 3. – С. 83–91.
3. Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособ. для біол. спец. вузов / Г. Ф. Лакин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Вищш. шк., 1990. – 352 с.
4. Леус І. В. Активність супероксиддисмутази та інтенсивність оксидативного стресу при застосуванні кластерних сполук ренію з алкільними лігандами як протипухлинних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / І. В. Леус. – К., 2012. – 21 с.
5. Синтез и свойства цис-тетрагалогено-дикарбоксилатных производных дирения(III) с адамантан-карбоновыми кислотами / А. В. Штеменко, А. А. Голиченко, И. Г. Семёнова, Я. С. Вербицкая // Вопр. химии и хим. технологии. – 2001. – № 4. – С. 31–34.
6. Blakley B. W. Strategies for prevention of toxicity caused by platinum-based chemotherapy / B. W. Blakley // Laryngoscope. – 2001. – 112. – P. 1997–2001.

7. Dawson J. M. Method of protein quantification Evidence for Photosensitivity / J. M. Dawson, P. L. Heatlie Lowry // Anal. Biochem. – 1984. – **140**, № 2. – P. 391–393.
8. Ellagic acid prevents cisplatin-induced oxidative stress in liver and heart tissue of rats / Y. Abdurrauf, Ahmet, O. C. Atessahin [et al.] // Dfsic. Clin. Pharmakol. Toxicol. – 2007. – **101**. – P. 345–349.
9. Glutamyl Transpeptidase. What Does the Organization and Expression of a Multipromoter Gene Tell Us about its Functions? / W. Lieberman Michael, Roberto Barrios, Z. Bing [et al.] // American Journal of Pathology. – 1995. – **147**, № 5. – P. 1175–1185.
10. Iraz M. Protective effect of caffeic acid phenethyl ester administration on Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin-induced oxidative damage to liver in rat / M. Iraz // Cell. Biochem. Funct. – 2006. – **24**. – P. 357–361.
11. Jaeschke H. Use of isolated perfused organs in hypoxia and ischemia/ reperfusion oxidant stress / H. Jaeschke, J. R. Mitchell // Methods Enzymol. – 1990. – **186**. – P. 752–759.
12. Koc A. Protective agent, erdosteine, against Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin-induced hepatic oxidant injury in rats / A. Koc // Mol. Cell. Biochem. – 2005. – **278**. – P. 79–84.
13. Leitao D. J. Quantification of sodium thiosulphate protection on Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin-induced toxicities / D. J. Leitao, B. W. Blakley // J. Otolaryngol. – 2003. – **32**. – P. 146–150.
14. Liposomal Forms of Rhenium Cluster Compounds: Enhancement of Biological Activity / N. I. Shtemenko, E. D. Zubitskaya, O. V. Berzenina [et al.] // Chemistry&Biodiversity. – 2008. – **5**. – P. 1660–1667.
15. Lu Y. Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin-induced hepatotoxicity is enhanced by elevated expression of cytochrome P450 2E1 / Y. Lu A. I. Cederbaum // Toxicol. Sci. – 2006. – **89**. – P. 515–523.
16. Mohamed Yousif Ibrahim. Attenuation of cisplatin-induced hepatotoxicity in rat using Zerumbone Mohamed Yousif Ibrahim // Research Journal of Biological Sciences. – 2009. – **4**, № 7. – P. 777–784.
17. Pratibha R. Enzymatic studies of Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin induced oxidative stress in hepatic tissue of rats / R. Pratibha // Eur. J. Pharmacol. – 2006. – **532**. – P. 290–293.
18. Rabik C. A. Molecular mechanisms of resistance and toxicity associated with platinating agents / C. A. Rabik, M. E. Dolan // Cancer Treatment Rev. – 2007. – **33**. – P. 9–23.
19. Reitman S. A colorimetric method for the determination of serum glutamic oxalacetic and glutamic pyruvic transaminases / S. Reitman, S. Frankel // Amer. J. Clin. Pathol. – 1957. – **28**. – P. 56–63.
20. Shtemenko A. V. Synthesis, characterization, in vivo antitumor properties of the cluster rhenium compound with GABA ligands and its synergism with cisplatin / A. V. Shtemenko // Dalton Trans. – 2009. – **26**. – P. 5132–5136.
21. Shtemenko N. Dichlorotetra-mu-isobutyrylato dirhenium(III): enhancement of cisplatin action and RBC-stabilizing properties / N. Shtemenko // Anticancer Res. – 2007. – **27**. – P. 2487–2492.
22. Taylor S. K. Erythropoetin (EPO) more than treatment of anemia in cancer and chemotherapy? / S. K. Taylor // Medical Hypothesis. – 2003. – № 1. – P. 89–93.
23. Visarut T. M. Pathways of glutathione metabolism and transport in isolated proximal tubular cells from rat kidney / T. M. Visarut // Biochem. Pharmacol. – 1996. – **52**. – P. 259–272.
24. Weijl N. I. Supplementation with antioxidant micronutrients and chemotherapy-induced toxicity in cancer patients treated with Cisplatin 10 mg kg⁻¹ platin-based chemotherapy: A randomised, double-blind, place-bocontrolled study / N. I. Weijl // Eur. J. Cancer. – 2004. – **40**. – P. 1713–1723.
25. Wildefield J. B. Gamma Glutamyl Transferase / J. B. Wildefield // Clinical Laboratory Sciences. – 2001. – **38**, № 4. – P. 263–355.
26. Zorzi D. Chemotherapy-associated hepatotoxicity and surgery for colorectal liver metastases / D. Zorzi // Br. J. Surg. – 2007. – **94**, № 3. – P. 86–95.

Е. С. Кулинич, О. А. Демшина, Н. И. Штеменко
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

МОДУЛЯЦІЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ЦІСПЛАТИНА КЛАСТЕРНИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ РЕНИЯ(ІІІ) В МОДЕЛІ КАНЦЕРОГЕНЕЗА

Резюме

Введення соєднення рения з ізобутиратними лігандами, розташованими в цис-положенні вокруг четвертичної зв'язки, приводило до торможенню процесів цитоліза клеток печени і зниженню активації ферментативних процесів тканей печени в моделі канцерогенеза і при введенні цісплатина. Соєднення $Re_{cisobut}$ проявило більш ефективні властивості к модуляції гепатотоксичного діяння цісплатина, ніж аналогічне соєднення рения з адамантильними лігандами. Вперше вивчено зміщення глутатіона

в клетках печени и плазме крови крыс-опухоленосителей при введении системы рений–платина и предложено предположительную схему, объясняющую возможную роль глутатионовой системы в проявлении гепатопротекторных свойств соединений с четвертичной связью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: **модуляция, гепатотоксичность, цисплатин, кластерные соединения рения(III).**

O. S. Kulinich, O. O. Dyomshyna, N. I. Shtemenko
OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY

MODULATION OF CISPLATIN HEPATOTOXICITY USING CLUSTER COMPOUNDS OF RHENIUM(III) IN A MODEL OF CARCINOGENESIS

Summary

Introduction of compounds of Rhenium with isobutyrate ligands situated in cis-configuration around quadruple bond led to inhibition of cytolysis of liver cells and reduced activation of enzymatic processes of the liver tissue in a model of carcinogenesis. The compound with isobutyrate ligands showed more effective properties in modulation of cisplatin hepatotoxicity than the analogous rhenium compounds with adamantyl ligands. The Rhenium-Platinum were first studied glutathione content in the liver and blood plasma of tumor-bearing rats after introduction and possible role of glutation system in hepatoprotective function compounds quadruple bond was proposed.

KEY WORDS: **modulation, hepatotoxicity, cisplatin, cluster compounds of Rhenium(III).**

Отримано 15.03.13

Адреса для листування: О. О. Дъомшина, вул. Тополина, 17, кв. 6, Дніпропетровськ, 49040, Україна, e-mail: d.olga.1970@gmail.com