
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПИАСКЛЕДИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ.



Авторы: Курята А.В., Черкасова А.В., Гармиш И.П. — ГУ «ДМА МЗ Украины», кафедра госпитальной терапии № 1 и профпатологии.

Рубрики: <u>Травматология и ортопедия</u> Разделы: Клинические исследования

Версия для печати

Статья опубликована на с. 15-20

Остеоартроз (ОА) — группа гетерогенных заболеваний суставов различной этиологии, характеризующихся прогрессирующим течением, деградацией суставного хряща с последующими изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, приводящих к потере хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава (синовиальная оболочка, связки, капсула и периартикулярные мышцы) [1]. ОА является наиболее частой причиной поражения суставов, с преимущественной локализацией в коленном и тазобедренном суставах (24 и 11 % соответственно) [2]. По результатам Фрамингемского эпидемиологического исследования (Framingham Osteoarthritis Study) показано, что за последние 20 лет частота ОА коленных суставов в популяции значительно увеличилась [3]. Так, по данным эпидемиологических исследований, люди, страдающие ОА, составляют почти 15 % населения Земли. В Европе и странах с высоким экономическим уровнем ОА по распространенности среди населения в возрасте 45–59 лет занимает второе место после ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярной патологии. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о социальных последствиях заболеваний ОА коленных суставов находится на 4-м месте среди причин нетрудоспособности у женщин и на 8-м — у мужчин. Увеличение продолжительности жизни и нарастающая доля людей с повышенной массой тела — основные причины стремительного роста

заболеваемости ОА [4]. Учитывая повышение продолжительности жизни, прогнозируется увеличение числа пациентов, длительно страдающих тяжелыми формами ОА [2].

ОА — многофакторная нозология, к вероятным предикторам которой можно отнести: возраст, пол, генетическую предрасположенность, избыточную массу тела. Деполимеризация белково-полисахаридных комплексов с образованием более мелких соединений, а также нарушение функции хондритов, синтезирующих менее стабильные протеогликаны, являются патогенетическим плащармом формирования протеогликановой недостаточности — основного звена в развитии ОА [3]. В настоящее время терапия ОА направлена на достижение двух целей: облегчение боли и ослабление функциональных нарушений. Одним из способов достижения данных целей является патогенетическая терапия — актуальный вопрос, обсуждаемый в ревматологии на протяжении последних лет. Препараты, используемые в терапии ОА, делятся на две основные группы: симптом-модифицирующие препараты (анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства — НПВС), уменьшающие боль и воспаление в суставах, и структурно-модифицирующие препараты, способные модифицировать структуру хряща. Последняя группа препаратов не только замедляет прогрессирование заболевания, но и активно влияет на основные симптомы ОА — воспаление и боль, т.е. обладает и симптом-модифицирующим эффектом [6]. Европейская антиревматическая лига (ЕULAR — The European League Against Rheumatism) отдельно выделила группу лекарственных средств, определяемых как препараты замедленного действия для симптоматической терапии остеоартроза (SYSADOA — symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis) [7, 8]. В рекомендациях по лечению ОА колена (2003) и бедра (2004), принятых ЕULAR, среди медленнодействующих симптоматических средств представлены неомыляемые компоненты авокадо

по сравнению с их изолированным применением, а степень ингибиции зависит от соотношения этих ингредиентов [6]. **Цель:** оценить клиническую эффективность препарата неомыляемых соединений масел авокадо и сои (Пиаскледин, Laboratoires Expanscience, Courbevoie, France) в комплексном лечении пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности.

и соевых бобов. К данной группе относится препарат Пиаскледин, обладающий доказанной клинической эффективностью и потенциальными хондропротективными свойствами. Пиаскледин представляет собой неомыляемые соединения авокадо и соевых бобов, получаемые в результате гидролиза, в пропорции 1 : 2 (Пиаскледин, A1S2, Laboratoires Expanscience, Courbevoie, France). Было показано, что сочетанное применение экстрактов авокадо и сои вызывает более выраженную ингибицию цитокинов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для оценки эффективности и переносимости препарата Пиаскледин было проведено открытое когортное клиническое исследование в двух группах. В исследование были включены 25 пациентов (21 женщина и 4 мужчин) с установленным диагнозом остеоартроза. Диагноз «остеоартроз» был установлен в соответствии с критериями АСК 1987 г. согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 12.10.2006 № 676. Исследование проводилось на базе отделения ревматологии ОКБ им. И.И. Мечникова.

Критериями включения были:

- OA I-III ст. (согласно Kellgren-Lawrence);
- возраст 40-75 лет;
- наличие одного из коморбидных состояний: дислипидемия, ожирение I–II ст., сахарный диабет, кардио–васкулярная патология (артериальная гипертензия, стабильная ИБС, хроническая сердечная недостаточность);
- информированное согласие пациента.

Критерии исключения:

- ОА IV ст.;
- остеопороз I типа;

- использование симптоматических препаратов замедленного действия в течение последних трех месяцев (глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, гиалуроновая кислота);
- СД I типа;
- другие заболевания, сопровождающиеся костно-хрящевой резорбцией;
- онкологические заболевания;
- гемодинамические значимые аритмии и пороки сердца;
- острая кардиоваскулярная патология;
- заболевания кишечника (колит, энтерит);
- скорость клубочковой фильтрации ниже

60 мл/мин/1,73 м2;

- нарушение функции щитовидной железы (гипо-, гипертиреоз);
- заболевания крови.

Все пациенты случайным образом были разделены на 2 сопоставимые по возрасту и длительности заболевания группы (табл. 1) в соответствии с получаемой терапией. Пациенты 1-й группы (n = 15) в составе комплексной терапии получали Пиаскледин в дозе 300 мг 1 раз в день. Пациенты 2-й группы (n = 10) — только симптоммодифицирующие препараты (анальгетики и НПВС). Срок наблюдения составил 3 месяца.

Как видно из табл. 1, преобладали пациенты с ОА коленных суставов в обеих группах наблюдения: 9 человек (60 %) в основной группе и 7 (70 %) — в конт-рольной.

Таблица 1. Характеристика групп наблюдений

Параме- тры	Груг Основная (n = 15)	Контроль- ная (n = 10)	р
Пол	Мужчины — 1 Женщины — 14	Мужчины — 2 Женщины — 8	-
Возраст (лет)	62,80 ± 2,38	61,30 ± 2,85	
Вес (кг)	79.0 ± 3.6	81,7 ± 5,4	
Рост (см)	163,5 ± 1,2	165,6 ± 3,1	
Окруж- ность талии (см)	96,2 ± 3,1	92,8 ± 4,2	P > 0,05
Индекс массы тела (кг/м²)	29,4 ± 1,1	29,7 ± 1,6	
Длитель- ность за- болевания (лет)	13,1 ± 2,4	10,0 ± 1,9	
Рентгено- логическая стадия	I стадия — 3 II стадия — 11 III стадия — 1	I стадия— 6 II стадия— 4 III стадия— 0	-

Таблица 2. Характеристика пациентов в зависимости от локализации процесса и рентгенологической стадии ОА

Покодиоония	Группы		
Локализация поражения	Основная (n = 15)	Контрольная (n = 10)	
Остеоартроз кистей	I стадия — 1 II стадия — 4 III стадия — 0	I стадия — 1 II стадия — 1 III стадия — 0	
Остеоартроз коленных суста- вов	I стадия — 2 II стадия — 6 III стадия — 1	I стадия — 4 II стадия — 3 III стадия — 0	
Остеоартроз бедра	I стадия — 0 II стадия — 1 III стадия — 0	I стадия — 1 II стадия — 0 III стадия — 0	

В ходе исследования у всех пациентов использовали:

- 1) общеклиническое исследование, включая общий анализ крови, почечно-печеночный комплекс, ревмокомплекс;
- 2) четырехбалльную шкалу оценки эффективности лечения пациентом/врачом;
- 3) рентгенографию суставов с определением рентгенологической стадии заболевания;
- 4) оценку боли в покое и при физической нагрузке (визуальная аналоговая шкала (ВАШ));
- 5) определение степени нарушения функции суставов (HAQ-ID);
- 6) оценку функционального состояния больных (WOMAC)
- 7) определение психоэмоционального состояния (шкала тревоги и депрессии HADS);
- 8) оценку степени приверженности пациентов к терапии (шкала Мориски Грина).
- В ходе исследования была проанализирована взаимосвязь интенсивности боли и активности процесса, получаемой терапии, степени —функциональных нарушений суставов и рентгенологической стадии. Длительность наблюдения составила 3 месяца. Динамику клинических изменений определяли по результатам повторного анкетирования (HAQ-ID, WOMAC, шкала тревоги и депрессии HADS), оценки боли согласно ВАШ через 1, 2 и 3 месяца после начала исследования.

Статистический анализ проводился с помощью Microsoft Excel 2010 (Microsoft), STATISTICA for Windows 7.0 (StatSoft Inc., США). Количественные показатели представлены в виде n, $M \pm m$, где n — количество наблюдений, M — среднее, m — стандартное отклонение. Достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента для непараметрических данных. Критическое значение уровня значимости (p) ≤ 0.05 .

РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале исследования всем пациентам определяли индекс комплайентности к терапии согласно шкале Мориски — Грина. Уровень приверженности к терапии был достаточно высоким — 73 % пациентов в основной группе и 70 % — в контрольной относились к приверженным (комплайентным) (рис. 1).




Рисунок 1. Шкала комплайентности Мориски — Грина

Таблица 3. Оценка эффективности лечения пациентом и врачом, % (n)

Показа- тель в баллах	Основная груп- па		Контрольная группа	
	Оценка паци- ентом	Оценка врачом	Оценка паци- ентом	Оценка врачом
Отлично — 4	26,7 (4)	33,3 (5)	6,7 (1)	6,7(1)
Хорошо — 3	66,7 (10)	66,7 (10)	60 (9)	53,3 (8)
Удовлет- воритель- но — 2	6,6 (1)	0	33,3 (5)	40 (6)
Плохо — 1	0	0	0	0

Таблица 4. Взаимосвязь выраженности ответа на терапию с рентгенологической стадией ОА по Kellgren-Lawrence в основной группе, n (%)

Рентгенологическая стадия (Kellgren-Lawrence)	Отлично	Хорошо	Удовлет- воритель- но
T	3 (100)	0	0
II	1 (9,9)	10 (90,1)	0
Ш	0	0	1 (100)

Все пациенты основной группы отмечали субъективное улучшение самочувствия на фоне приема Пиаскледина. Согласно четырехбалльной шкале оценки эффективности лечения пациентом большинство оценили ее как «хорошую» — 66,7 % (10 человек) (табл. 3).

Все пациенты с ОА I рентгенологической стадии субъективно оценили эффективность лечения на «отлично», большая часть пациентов со II рентгенологической стадией ОА (90,1 %) — «хорошо» (табл. 4).

Интенсивность боли в коленных суставах согласно ВАШ достоверно снизилась как при нагрузке, так и в покое после третьего месяца приема препарата — на 59.7 и 56.7 % соответственно (p < 0.01) (puc. 2).

Выраженность боли в суставах кистей также имела тенденцию к снижению. В основной группе боль при физической нагрузке к концу наблюдения уменьшилась на 60,8 %, в покое — на 55 %. Тогда как в контрольной группе интенсивность боли при нагрузке снизилась лишь на 16,7 % при отсутствии динамики выраженности боли в покое (рис. 3).





Рисунок 3. Динамика интенсивности боли в суставах кистей (ВАШ)



Исходя из полученных результатов, ОА тазобедренного сустава характеризуется менее выраженным клиническим ответом по сравнению с ОА суставов кисти и коленных суставов. Так, в основной группе боль в покое снизилась на 33,3 %, при физической нагрузке — на 50 %, в контрольной группе не было зарегистрировано достоверной динамики этих показателей.

Через 3 месяца после начала лечения отмечено достоверное (p < 0,01) уменьшение болевого синдрома и улучшение функционального состояния пациентов (улучшение повседневной активности, меньшее –ограничение подвижности) в обеих группах наблюдения, что подтверждено результатами анкетирования WOMAC (рис. 4). В контрольной же группе не было зарегистрировано достоверного снижения ни одного из показателей WOMAC (рис. 5).

Через 3 месяца после начала исследования отмечен хороший клинический эффект Пиаскледина у пациентов с ОА, что проявлялось улучшением таких клинических показателей, как индекс HAQ. Через 3 месяца лечения было достигнуто достоверное снижение функционального индекса HAQ у пациентов основной группы (-0,67) — с $1,41 \pm 0,23$ до $0,74 \pm 0,19$ (p < 0,05) (рис. 6).




Рисунок 6. Динамика функционального индекса HAQ Примечание: * — p < 0,05.

В начале исследования у пациентов обеих групп зарегистрирована субклинически и клинически выраженная депрессия. К концу исследования была отмечена положительная динамика психоэмоционального статуса. Так, в основной группе проявления субклинически выраженной тревожности и депрессии снизились на 19,99 (р < 0,01) и 33,33 % (р < 0,01) соответственно. Сходная динамика отмечалась и в группе пациентов с клинически выраженной тревожностью. У пациентов основной группы зарегистрировано улучшение психоэмоционального статуса согласно госпитальным шкалам тревоги и депрессии (HADS-A, HADS-D). В ходе исследования была проанализирована необходимость в дополнительном обезболивании (прием HПВС) (табл. 5).

Таблица 5. Характеристика групп в зависимости от потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах, n (%)

Потреб-	Основная группа		Контрольная группа	
нпвс	Первый визит	Послед- ний визит	Первый визит	Послед- ний визит
Еже- дневно	7 (46,7)	3 (20,1)	5 (33,3)	5 (33,3)
2-3 раза в неде- лю	6 (40)	5 (33,3)	7 (46,6)	8 (63,3)
По по- требно- сти	2 (13,3)	7 (46,7)	3 (20,1)	2 (13,4)

У пациентов, принимавших Пиаскледин, была отмечена тенденция к снижению потребности в приеме НПВС (рис. 7). В группе контроля динамики снижения потребности в дополнительном приеме НПВС не наблюдалось.




Рисунок 7. Изменение потребности в НПВС у пациентов основной группы

За 12 недель применения препарата Пиаскледин у больных с ОА значимых побочных реакций, требующих отмены препарата, не зарегистрировано. Таким образом, хороший клинический эффект и переносимость препарата Пиаскледин позволяют использовать его как препарат выбора у пациентов с остеоартрозом.

выводы

- 1. При использовании Пиаскледина у пациентов с ОА отмечалось снижение выраженности болевого синдрома как при физической нагрузке, так и в покое более чем в два раза, что привело к улучшению функционального состояния суставов.
- 2. Хороший ответ на терапию был получен у пациентов с ОА коленных суставов, аналогичная динамика наблюдалась у пациентов с ОА кистей. Наименее чувствительной к терапии была группа пациентов с ОА тазобедренных суставов.
- 3. Уменьшение болевого синдрома и расширение двигательной активности привело к улучшению качества жизни и психосоматического статуса пациентов.
- 4. Пиаскледин оказал хороший эффект у пациентов с начальными стадиями ОА (I–II по Kellgren-Lawrence), с максимальной эффективностью на первой. Таким образом, целесообразно начинать терапию как можно раньше для получения более выраженного клинического ответа.

5. Использование Пиаскледина у пациентов с ОА в условиях коморбидности не привело к декомпенсации и изменению течения сопутствующей патологии, требующей коррекции терапии (набор веса, повышение артериального давления или функционального класса ИБС, развитие гипо- и гипергликемических состояний).

Список литературы / References

- 1. Поворознюк В. Здоров'я України: современные принципы лечения / В.В. Поворознюк // Здоров'я України. 2015. № 2 (39). С. 65-69.
- 2. Зоткин Е.Г. Особенности ведения пациентов с остео-артрозом в первичном звене здравоохранения / Е.Г. Зоткин, С.Ю. Шкиреева // РМЖ. 2012. № 27. С. 32-36.
- 3. Борткевич О.П. Ефективність препарату Піаскледин 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою // Український ревматологічний журнал. 2015. № 1 (59). С. 61-65.
- 4. Очертяная Н.С. Хондропротекторы при заболеваниях суставов: здоровье, которое дарит природа / Н.С. Очертяная // Здоров'я України. 2012, сентябрь. С. 78.
- 5. Шостак Н.А. Остеоартроз: актуальные вопросы диагностики и лечения / Н.А. Шостак // РМЖ. 2014. № 4. С. 278.
- 6. Fernandes L., Hagen K.B., Bijisma J.W. EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis // Ann. Rheum. Dis. 2013. P. 1-11.
- 7. Zhang W., Donerty M., Peat G. et al. EULAR evidence-based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis // Ann. Rheum. Dis. 2010. Vol. 69 (3). P. 483-489.
- 8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 № 676 Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із остеоартрозом (ОА), Код МКХ-10: М15