

ЦИСТИТ У ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Н.О. Сайдакова ¹, О.В. Шуляк ¹, Л.М. Старцева ¹,
Г.Є. Кононова ¹, В.І. Гродзінський ²

¹ ДУ «Інститут урології НАМН України»

² Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Вступ. Здоров'я дитячого населення є основним маркером соціально-економічного розвитку країни, її спроможності та благополуччя в цілому. Воно визначається особливістю захворюваності, поширеності серед дітей хвороб з частим, рецидивуючим перебігом, що призводять до несприятливих наслідків. Метою даної роботи стало відображення даного аспекта з точки зору урологічної патології. Цистити складають таку проблему, оскільки, крім вказаних ознак, що є джерелом висхідної інфекції, і спричинює розвиток пієлонефриту. Реальність ситуації актуалізує проблему їх профілактики.

Матеріали та методи. Робота базується на даних державної і галузевої статистичної звітності медичних закладів МОЗ України та Державної служби статистики України (форма № 12). Представлена 5-річна (2013–2017 рр.) динаміка захворюваності та поширеності циститу з урахуванням статі серед різних вікових груп дітей України, в тому числі його хронічної форми. Аналізувались середні величини з їх похибкою, темп приросту (зниження) показників; при необхідності, критерій Стьюдента для доведення різниці порівнювальних величин.

Результати та їх обговорення. Важливою передумовою є факт скорочення народжуваності в Україні з 11,1 у 2013 р. до 9,4 у 2017 р. (на 15,3%), а також зменшення чисельності дитячого населення (на 4,5%) практично за рахунок

підлітків (на 25,0%). У 2017 році на облік перебувало понад 23 тис. дітей хворих на цистит, що складає 0,3% від загальної їх кількості; при цьому серед підлітків показник утричі більший, ніж у віковій групі дітей 0-14 років (0,7 проти 0,24 відповідно). Особливість проявляється не тільки перевагою у дітей 15-17 років як рівнів захворюваності так й поширеності, порівняно з дітьми віком 0-14 років (6,35 проти 2,29 та 6,64 проти 2,43 відповідно). Крім того, спостерігається суттєвий приріст показників – за 5 років на 30,0% та 26,2% відповідно на тлі їх зниження серед дітей 0-14 років (на 2,3% та 2,4% відповідно). Потребує уваги також подібність динаміки хронічного циститу: зростання рівнів захворюваності (на 30%), поширеності (на 10,8%) серед підлітків при стабільних показниках захворюваності (0,04) та зменшення рівнів поширеності (на 5,0% до 0,17). Найбільш небезпечним і, водночас, найбільш поширеним хронічний цистит є для дівчат. Їх питома вага перебуває в межах 81 – 85% та інтенсивніше зростає серед підлітків.

Висновки. Отримані дані підтверджують актуалізацію організації профілактики, адекватної спеціалізованої допомоги дітям з циститом, що потребує міждисциплінарного підходу та залучення засобів масової інформації, особливо з огляду на визначену при дослідженні групи ризику дітей віком 15-17 років.

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНOSTІ ВРОДЖЕНИХ ВАД НИРОК СЕРЕД РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Н.О. Сайдакова ¹, О.В. Шуляк ¹, Л.М. Старцева ¹,
С.П. Дмитришин ², Г.Є. Кононова ¹

¹ ДУ «Інститут урології НАМН України»

² Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Вступ. Вроджені вади нирок відносяться до важливого напрямку клінічної урології з огляду не тільки в потребі своєчасного їх вияв-

лення і, при необхідності, відповідної хірургічної корекції, але й з точки зору наявності реальних умов виникнення у них ускладнень, що