

ISSN 1818-9385

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНІ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE



- **окружающая среда**
навколишнє середовище
environment
- **профессиональное**
здоровье
професійне здоров'я
occupational health
- **патология**
патологія
pathology

2015
№ 3, т. 1 (41-I)

Медицинский научный журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3, т. 1 (41-I), 2015 р.

Заснований у серпні 2005 р.



Головний редактор
Науковий редактор

д.м.н. А.І.Гоженко
д.м.н. Л.М.Шафрран

The editor-in-chief
The scientific editor

A.I.Gozhenko
L.M.Shafran

Редакційна колегія

Л.В.Басалаєва, д.м.н. Є.П.Белобров, д.м.н. В.С. Белокриницький, д.В.Большой (відповідальний секретар), д.м.н. Г.К.Васильєв, д.б.н. М.Я.Головенко, д.м.н. О.В.Горша, В.М.Євстаф'єв, Т.Л.Лебедєва, д.м.н. В.О.Любобей, д.б.н. І.А.Кравченко, д.м.н. Б.А.Насібулін, Б.В.Панов, д.б.н. Н.Ф.Петренко, О.Г.Пихтеєва, д.б.н. Е.М.Псяядло, Д.П.Тимошина

Склад наукової редакційної ради:

С.А.Андронаті (Україна), В.П.Антонович (Україна), К.Д.Бабов (Україна), Л.І.Власик (Україна), Ю.Л.Волянський (Україна), М.Р.Гжеготський (Україна), В.А.Голіков (Україна), М.Я.Головенко (Україна), Ю.І.Губський (Україна), В.М.Запорожан (Україна), В.О.Капцов (Росія), М.О.Колесник (Україна), Ю.І.Кундієв (Україна), Р.Ольшанський (Польща), А.Є.Поляков (Україна), М.Г.Проданчук (Україна), В.Г.Руденко (Україна), Х.Саарні (Фінляндія), А.М.Сердюк (Україна), А.В.Скальний (Росія), Д.Г.Ставрев (Болгарія), І.Твардовська (Польща), І.М.Трахтенберг (Україна), Ш.Хан (США), А.З.Цфасман (Росія), К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), К.О.Шаріпов (Казахстан), К.Шрамм (Німеччина), Б.М.Штабський (Україна), О.П.Яворівський (Україна)

Editorial board

L.V.Basalaeva, E.P.Belobrov, V.S.Belokrinitskiy, D.V.Bolshoy (the responsible secretary), G.K.Vasiljev, M.J.Golovenko, O.V.Gorsha, V.M.Evstafjev, T.L.Lebedeva, V.A.Lisobey, I.A.Kravchenko, B.A.Nasibullin, B.V.Panov, N.F.Petrenko, E.G.Pykhyteyeva, E.M.Psiadlo, D.P.Timoshina

Structure of scientific editorial council:

S.A.Andronati (Ukraine), V.P.Antonovich (Ukraine), K.D.Babov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), Yu.L.Voliansky (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), V.A.Golikov (Ukraine), M.J.Golovenko (Ukraine), Yu.I.Gubsky (Ukraine), V.M.Zaporozhan (Ukraine), V.O.Kaptsov (Russia), M.O.Kolesnik (Ukraine), Yu.I.Kundiev (Ukraine), R.Olszanski (Poland), A.E.Poljakov (Ukraine), M.G.Prodanchuk (Ukraine), V.G.Rudenko (Ukraine), H.Saarni (Finland), A.M.Serdjuk (Ukraine), A.V.Skalny V.V. (Russia), D.G.Stavrev (Bulgaria), I.Twardowska (Poland), I.M.Trakhtenberg (Ukraine), Sh.U.Khan (USA), A.Z.Tsfasman (Russia), K.Sh.Shajisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K. Shramm (Germany), B.M.Shtabsky (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел/факс: +380-48-726-47-93, 728-01-47
E-mail: journal-medtrans@rambler.ru

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone/fax: +380-48-726-47-93, 728-01-47
E-mail: journal-medtrans@rambler.ru

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних неєуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retain the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Бюл. ВАК України, № 11, 2009)

Журнал зареєстрований в міжнародних наукометрических базах «Российский Индекс Научного Цитирования» (РИНЦ, Росія) та Copernicus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Вченюю радою УкрНДІ медицини транспорту та Редакційною колегією журналу.

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316

Адреси електронної версії:
<http://aptm.org.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua>
http://www.nbuu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Подписано в печать 25.05.2015 г. Гарнитура Pragmatica. Формат 64x90/8. Печать офсетная. Усл. печ. лист. 17,2.
Отпечатано с готового макета в типографии "ART-V". г. Одесса, ул. Комитетская, 24А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Украинского научно-исследовательского
института медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины и
Физико-химического института
им. А.В.Богатского Национальной академии
наук Украины

№ 3, т. 1 (41-І), 2015 г.

Основан в августе 2005 г.



Содержание:

Content:

Медицина катастроф

7

Emergency Medicine

ЕКОНОМІЧНЕ ТА НАУКОВЕ
ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
УДОСКОНАЛЕНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
ОБЛАСНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНІ
КАТАСТРОФ ПРИ РЕАГУВАННІ НА АВІАЦІЙНІ
ПОДІЇ — Люлько О.М., Галацан О.В.

7

ECONOMIC AND SCIENTIFIC GROUND OF
INTRODUCTION TO THE IMPROVED
ORGANIZATION OF WORK OF REGIONAL
SERVICE MEDICINES OF CATOSNROPHES
DURING ON AVIATION FAILURES —
Lyul'ko O.M., Galatzan O.V.

Гигиена, эпидемиология, экология

12

Hygiene, Epidemiology, Ecology

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСАДІВ
СТІЧНИХ ВОД М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ —
Крамарьова Ю.С.

12

ECOLOGIC-AND-HYGIENIC ESTIMATION OF
WASTE WATERS SLUDGES OF THE CITY OF
DNEPROPETROVSK AND PERSPECTIVES OF
THEIR UTILIZATION — *Kramareva Yu. S.*

Вопросы психофизиологии

21

The Psychophysiology Questions

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩАННЯ
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ З
ЕПІЛЕПСІЄЮ — Ковтюк Н.І.

21

REGARDING THE POSSIBILITY OF
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN
CHILDREN WITH EPILEPSY — *Kovtyuk N.I.*

**Клинические аспекты медицины
транспорта**

25

Clinical Aspects of Transport Medicine

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕІНАЗНО-
ІНГІБІТОРНОГО ПОТЕНЦАЛА В ПЛАЗМІ
КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ — Бурлака
Ю.Б., Гринь Н.В., Кизим О.Й., Версьовка С.В.

25

THE INVESTIGATION OF PROTEINASEINHIBI-
TORY POTENTIAL IN BLOOD PLASMA OF
PATIENTS WITH LARYNX CANCER — *Burlaka
Yu.B., Gryn' N.V., Kizim A.I., Verevka S.V.*

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЇЇ ДІАГНОСТИЧНА
ЗДАТНІСТЬ У ЖІНОК ПІСЛЯ ВАГІНАЛЬНИХ
ОПЕРАТИВНИХ ПОЛОГІВ: ПОРІВНЯЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХ МЕТОДІВ ВАКУУМ-
ЕКСТРАКЦІЇ — Кукуруза І.Л., Могілевкіна І.О.

29

VALUING THE QUALITY OF LIFE AND ITS
DIAGNOSTIC ABILITY AFTER WOMAN'S
VAGINAL OPERATIVE DELIVERY: COMPARA-
TIVE STUDY OF TWO METHODS OF VACUUM
EXTRACTION — *Kukuruza I.L., Mogilevskina I.A.*

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ
ЛІКТЬОВОГО ВІДРОСТКА — Жук П.М.,
Філоненко Е.А., Гребенюк Д.І.

32

MODERN TECHNIQUES IN OLECRANON
FRACTURE TREATMENT — *Zhuk P.M.,
Filonenko E.A., Grebenuk D.I.*

ВЛИЯНИЕ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯ-
ЩИХ ПУТЕЙ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ХЕЛИКОБАК-
ТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИ-
ЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ — Короленко Р.Н.,
Авраменко А.А., Шухтина И.Н.

35

INFLUENCE BILIARY DYSKINESIA ON THE
IDENTIFICATION OF HELICOBACTER PYLORI
INFECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC
NON-ATROPHIC TESTING GASTRITIS —
Korolenko R.N., Avramenko A.A., Shukhtina I.N.

УДК 631.421:632.95

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ УТИЛІЗАЦІЇ

Крамарсьова Ю.С.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

julia-grata@rambler.ru

Стаття присвячена комплексній еколо-гігієнічній оцінці осадів міських стічних вод станцій аерації м. Дніпропетровська. Надана динаміка основних показників осадів зі збільшенням термінів їх зберігання на мулових майданчиках. Запропоновано новий перспективний спосіб вилучення важких металів із осадів міських стічних вод.

Ключові слова: важкі метали, осади міських стічних вод

Актуальність

В умовах сьогодення невирішеною екологічною та гігієнічною проблемою є питання утилізації осадів міських стічних вод, які накопичуються в особливо значимих обсягах на межі сельбищних територій населених пунктів [1]. Фактично існуючі технології очищення стоків на станціях аерації м. Дніпропетровська (Південній, Лівобережній та Центральній) реалізують традиційну схему, що включає механічне, біологічне очищення, знезаражування стоків та обробку осаду. За відсутності безпечних технологій утилізації осади потенціюють ризик прямого та опосередкованого негативного впливу на стан здоров'я населення. По-перше, вони несуть в собі реальну епідемічну загрозу, оскільки містять інгредієнти мікробного, вірусного, паразитарного та гельмінтного походження. По-друге, як фракція суміші побутових і промислових стічних вод, осади здатні концентрувати у своєму складі велику кількість небезпечних хімічних речовин – важких металів (свинцю, кадмію, цинку, хрому, нікелю, ртуті, миш'яку та інших), нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, поліцикліческих ароматичних вуглеводнів, що формує їх токсикологічну небезпеку. Нарешті, їх багаторічне складування навколо станцій аерації, вилучає з раціонального використання дефіцитні міські площа. Разом з тим, у складі осадів містяться значні запаси біогенних елементів (азоту, фосфору та калію), що дає

можливість їх подальшого використання в якості органо-мінерального добрива, стимулювати зростання здатності ґрунтів до самоочищеннЯ та покращувати таким чином їх санітарний стан [2]. Однак, на сьогодні, провідним медико-біологічним чинником, що стримує корисне вторинне застосування осадів стічних вод індустріальних міст України, є їх токсикологічна небезпека через можливе додаткове надходження з них у об'єкти довкілля токсичних речовин, насамперед, важких металів (ВМ) [3].

Виходячи з вищепереліченого, метою дослідження була еколо-гігієнічна оцінка осадів міських стічних вод за вмістом валових та рухомих форм найбільш поширених полютантів – важких металів та перспективи їх вилучення за допомогою комплексоутворюючого реагенту.

Матеріал та методи

Досліджено зразки осадів міських стічних вод (загалом 270 проб) з різним терміном їх зберігання (свіжі, 1 рік та 3 роки), відібрани на мулових майданчиках трьох станцій аерації міста Дніпропетровська (Лівобережна, Південна та Центральна). Вміст валових та рухомих форм важких металів досліджували за допомогою атомно-абсорбційного методу з використанням спектрофотометру AAS-1N в полу-газової суміші «ацетилен-повітря». Рухомі форми важких металів вилучають з ОМСВ за допомогою буферного амонійно-ацетатного розчину з pH 4,8. Для вив-

чення ефективності вилучення з ОМСВ рухливих форм ВМ було використано комплексоутворюючий реагент, зокрема комплексон динатрієва сіль етилендіамінтитрацетату (ЕДТА або «трилон Б»). Для екстракції ВМ з ОМСВ використовували 0,05 М та 0,1 М розчини ЕДТА. Для визначення оптимальної концентрації та об'єму ЕДТА для екстракції ВМ з ОМСВ використовували співвідношення ОМСВ/0,05 М та 0,1 М розчини ЕДТА: 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Одержані результати оброблені традиційними методами варіаційної статистики з використанням інтегрованої програми MS Excel 2007.

Результати та обговорення

Оцінка результатів досліджень вмісту важких металів (марганцю, цинку, міді, свинцю, кадмію та кобальту) в осадах стічних вод свідчить про їх значні концентрації в проаналізованих зразках. Вміст валових форм токсичних елементів у досліджуваних зразках за середніми величинами коливався: від $(51,85 \pm 3,21)$ до $(159,85 \pm 13,61)$ мг/кг для свинцю; від $(2,04 \pm 0,03)$ до $(12,11 \pm 0,02)$ мг/кг для кадмію, від $(87,92 \pm 11,45)$ до $(523,76 \pm 45,43)$ для міді, від $(59,06 \pm 14,5)$ до $(260,44 \pm 12,67)$ для марганцю та від $(235,58 \pm 21,6)$ до $(1587,82 \pm 56,78)$ для цинку. Вміст валових форм свинцю перевищував його ГДК для ґрунту у 1,6 — 5 разів (за загальносанітарним показником шкідливості). Вміст марганцю, ГДК якого встановлено також для валової форми, знаходитьться в допустимих межах.

Результати наших досліджень свідчать, що середньозважений вміст рухливого кадмію в ОМСВ становить 0,19 мг/кг, що майже в 2 рази вище фонових значень для ґрунтів даної зони. Вміст рухомої міді значно вище і становить 12,1 мг/кг, з коливаннями від $(9,06 \pm 2,1)$ до $(20,4 \pm 3,2)$ мг/кг, що від 3 до 6,8 разів перевищує ГДК для ґрунту за загальносанітарним показником шкідливості (3 мг/кг). Середньозважений вміст рухомого цинку в досліджуваних ОМСВ становить 37,8 мг/кг з коливаннями від $(13,8 \pm 1,2)$ мг/кг до $(59,11 \pm 12,13)$ мг/кг, що від 1,37 до 2,6 разів пе-

ревищує ГДК для ґрунту за транслокаційним показником шкідливості (23 мг/кг). Вміст рухомої форми кобальту знаходився в межах ГДК.

В процесі зберігання ОМСВ на мулових майданчиках впродовж трьох років відбувалася зміна їх фізико-хімічних показників: вдвічі зменшилася вологість ($p < 0,001$), вміст нітратного азоту збільшився на 91,3 % ($p < 0,05$). Аналогічно збільшився вміст рухомого фосфору (на 15,2 % при $p < 0,05$) та калію (на 20 % при $p < 0,01$).

Оцінка результатів досліджень ВМ в ОМСВ 3-х станцій аерації показала, що найбільший вміст ВМ характерний для ОМСВ ПСА: коефіцієнт концентрації Zn складав 29,4, Mn — 24,6, Pb — 4,7, Cd — 7,3, що, вірогідно, пов'язано з відносно високою питомою вагою скиду на очисні споруди умовно очищених промислових стоків з розташованих навколо підприємств. При цьому вміст Mn та Co у всіх досліджуваних пробах ОМСВ ПСА був нижче фонових концентрацій для регіональних ґрунтів.

Згідно результатів досліджень санітарних показників ОМСВ 3-го року зберігання всі вони є безпечними в епідемічному відношенні, а також не містять вірусних агентів (вірус гепатиту А, ротавірус, аденоівірус) та життезадатних збудників паразитарних захворювань.

Встановлено, що для вилучення ВМ з ОМСВ 3-х річного терміну зберігання для подальшого виготовлення органо-мінеральних добрив та запобігання їх додаткового надходження у ґрунт, найбільш ефективним є використання 0,1 М розчину етилендіамінтитрацетату (ЕДТА) в співвідношенні 2:1, оскільки при цьому забезпечується найбільш повне вилучення ВМ. Наприклад, вміст Zn у оброблених ОМСВ зменшився у 10,2 рази порівняно з необробленими осадами при $p < 0,01$ і був нижчим фонових значень; вміст Cu — зменшився в 17,7 рази при $p < 0,001$, концентрація Mn в оброблених осадах також значно зменшилася та була меншою 0,1 мг/кг.

Враховуючи також економічний ас-

пект цього питання для практичного застосування нами рекомендовано використання 0,1M розчину ЕДТА в співвідношенні 1:1, оскільки при цьому залишкові концентрації ВМ у ОМСВ також не перевищують фонові для регіональних ґрунтів (вміст Zn у оброблених ОМСВ зменшується в 3,3 рази порівняно з необробленими при $p < 0,01$, вміст Mn – в 6 разів при $p < 0,001$, вміст Cu – в 3,3 рази при $p < 0,001$).

Під час обробки ОМСВ комплексном ЕДТА значна частина ВМ переходила у фільтрат, зокрема: Zn – 47,7 % ($p < 0,001$), Mn 16,7 % ($p < 0,001$), Cu 28,6 % ($p < 0,001$). У руслі проведеного дослідження це є перспективою подальшого наукового пошуку для вирішення можливості використання фільтрату – розчину комплекснатів есенціальних ВМ, зокрема цинку, міді, марганцю, кобальту та інших, в якості мікродобрив в хелатній формі.

Висновки:

1. Встановлено, що ведучими факторами сучасної проблеми утилізації ОМСВ великих індустріальних міст України є порушення технології обробки осаду на станціях аерації, зокрема відсутність етапу попереднього анаеробного зброджування та зневоднення сиріх осадів, внаслідок чого вони є епідемічно небезпечними та містять значну кількість токсичних речовин техногенного походження (зокрема важких металів).
2. З'ясовано, що в процесі дозрівання впродовж 3-х років на мулових майданчиках в складі осадів відбуваються важливі з еколого-гігієнічної точки зору зміни. Так, вдвічі зменшується вологість осаду ($p < 0,001$), за рахунок мінералізації органічної речовини значно зростає вміст рухомих форм поживних елементів (N, P, K): нітратного азоту – в 1,9 рази ($p < 0,05$), рухомого фосфору в 1,2 рази ($p < 0,05$), калію – в 1,2 рази ($p < 0,05$). Впродовж дозрівання ОМСВ спостерігається позитивна динаміка вмісту в них досліджених важких металів, найбільш показовими з яких є Mn,

вміст якого збільшується на 25-26 % ($p < 0,05$) та Zn, вміст якого збільшується на 20-51 % ($p < 0,05$). При цьому коефіцієнти концентрації ВМ у осадах по відношенню до фонових значень для регіональних ґрунтів становлять 29,4 (Zn); 25,0 (Cu); 7,4 (Cd); 4,7 (Pb).

3. Доведено, що ефективним методом вилучення ВМ з ОМСВ є їх зв'язування комплексоутворюючими речовинами з подальшим виведенням з фільтрату, зокрема розчинами ЕДТА. Використання 0,1 M розчину ЕДТА в співвідношенні 2:1 забезпечує найбільш повне вилучення ВМ: вміст Zn зменшується 10,2 рази ($p < 0,001$), Cu – в 17,7 рази ($p < 0,05$), Mn – в 6,2 рази ($p < 0,001$). Враховуючи економічний аспект цього питання практично виправданим є застосування 0,1 M розчину ЕДТА в співвідношенні 1:1, оскільки при цьому залишкові концентрації ВМ у ОМСВ не перевищують їх ГДК для ґрунту та фонові концентрації для регіональних ґрунтів.

Література

1. Сало Т.Л. Особливості технології утилізації осадів стічних вод міських очисних споруд у сільському господарстві/ Сало Т.Л., Чорнокозинський А.В., Вашкулат М.П./// Довкілля та здоров'я.-2006.- №2(37).-С.25-28.
2. Аликбаева Л.А. Эколого-гигиенические аспекты утилизации осадков сточных вод высокоурбанизированных территорий / Аликбаева Л.А. // Вісн. гіг. епід. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 164 – 168.
3. Ильин В.Б. К оценке массопотока тяжелых металлов в системе почва – сельскохозяйственная культура /Ильин В.Б./// Агротехника, 2006, №3. – С.52-59.

References:

1. Salo T.L. Features of technology utilization sewage sludge municipal wastewater treatment plants in agriculture / Salo T.L., Chornokozynskyy A.V., Vashkulat M.P. // Environment and zedorov'ya.-2006.- №2 (37). -S.25-28.
2. Alikbaeva L.A. Ecological and hygienic aspects of the disposal of sewage sludge highly urbanized areas /Alikbaeva L.A. // Her.

- sanitary epidemiology. — 2006. — V. 10, № 1. — S. 164 — 168.
3. Ilyin V.B. Estimation of the mass flow of heavy metals in the soil — agriculture /IlyinV.B.// Agrochemistry, 2006, №3. — S.52-59.

Резюме

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД Г.
ДНЕПРОПЕТРОВСКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ УТИЛИЗАЦИИ
Крамарева Ю.С.

Статья посвящена комплексной эколого-гигиенической оценке осадков городских сточных вод станций аэрации г. Днепропетровска. Представлена динамика основных показателей осадков с увеличением сроков их хранения. Предложен новый перспективный способ извлечения тяжелых металлов из осадков сточных вод.

Ключевые слова: тяжелые металлы, осадки городских сточных вод.

Summary

ECOLOGIC-AND-HYGIENIC ESTIMATION
OF WASTE WATERS SLUDGES OF THE
CITY OF DNEPROPETROVSK AND
PERSPECTIVES OF THEIR UTILIZATION

Kramareva Yu. S.

The article presented ecological and hygienic evaluation sediment of urban sewage stations of Dnipropetrovsk, made the evaluation of basic characterological figures residues with increased shelf life, developed a way to remove the heavy metals from sediment of urban sewage.

Keywords: heavy metal, sediment of urban sewage.

Впервые поступила в редакцию 11.05.2015 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

УДК 504.054:711.454:618.56

**ПЛАЦЕНТА КАК ИНДИКАТОР ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Белецкая Э.Н., Онул Н.М.

Кафедра общей гигиены ГУ «Днепропетровская медицинская академия
МЗ Украины», г. Днепропетровск; sangreena_@ukr.net

15

Плацента характеризуется выраженной чувствительностью к внешнесредовым химическим воздействиям, что подтверждается высокими уровнями внутриплацентарного накопления ксенобиотиков, концентрации которых у беременных промышленных регионов в 1,4-3,9 раза превышают аналогичные показатели женщин экологически чистых территорий и в 1,4-5,0 раз выше по сравнению с другими биосубстратами системы «мать-плацента-плод». При этом дополнительная нагрузка организма свинцом во время беременности вызывает повышение в 2,4-3,2 раза его накопления в плаценте с одновременным нарушением процессов транслокации эссенциальных микроэлементов и приводит к повреждению фетоплацентарного комплекса с выраженным дегенеративно-дистрофическими, дисциркуляторными, некробиотическими изменениями, сопровождается высоким уровнем эмбриолетальности, формированием внутриутробных дизадаптивных процессов,сложнениями беременности и родов, что позволяет обосновать включение плаценты как биомаркера в дизайн биомониторинговых исследований населения промышленных регионов.

Ключевые слова: плацента, гематоплацентарный барьер, техногенная нагрузка, тяжелые металлы.