

Міністерство охорони здоров'я України  
Національна академія медичних наук України  
ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України"  
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова  
Департамент охорони здоров'я Вінницької ОДА  
ГО "Українська Асоціація Нейрохірургів"  
ГО "Українська асоціація боротьби з інсультом"  
ГО "Подільська асоціація нейрохірургів"  
КЗ "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка"

**Науково-практична конференція  
нейрохірургів України  
з міжнародною участю  
"Організація та сучасні принципи  
надання спеціалізованої  
нейрохірургічної допомоги хворим  
на мозковий інсульт"**

м. Вінниця

5–7 вересня 2018 року

**Програма**

**Тези доповідей**

Вінниця 2018

## Ішемічний інсульт

---

### Эндоваскулярное лечение при ишемическом инсульте в острейшем периоде

Зорин Н.А.<sup>2</sup>, Чередниченко Ю.В.<sup>1</sup>, Мирошниченко А.Ю.<sup>1</sup>, Дзяк Л.А.<sup>2</sup>, Григорук С.П.<sup>1</sup>, Медведик А.Я.<sup>1</sup>, Юрченко Т.Д.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Днепропетровская областная клиническая больница имени И.И. Мечникова, Днепр, Украина

<sup>2</sup> Днепропетровская медицинская академия, Днепр, Украина

**Цель.** Оценить возможности эндоваскулярного лечения пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта.

**Материалы и методы.** В эндоваскулярном центре Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова 34 пациентам в острейшем периоде ишемического инсульта выполнялось эндоваскулярное лечение. До 2016 года 11 пациентам выполнены операции селективного артериального тромболитика. С 2016 года по июль 2018 года 23 пациентам в острейшем периоде ишемического инсульта выполнено эндоваскулярное лечение. 14 пациентам выполнена эндоваскулярная механическая тромбэкстракция. В одном из наблюдений тромбэкстракция дополнена каротидным стентированием в одну сессию, в другом - каротидное стентирование выполнено через 7 дней. 7 пациентам выполнено каротидное стентирование в острейшем периоде ишемического инсульта. В 2 наблюдениях выполнено стентирование диссекционных стенозов в V3-, V4-сегментах позвоночных артерий.

Оценка эффективности эндоваскулярного лечения пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта включала ангиографические и клинические критерии: уровень реканализации TICI 2b-3 при тромбэкстракции/тромболитика, устранение стенозов при выполнении операции стентирования, отсутствие новых ишемических и геморрагических очагов в головном мозге, регресс неврологического дефицита, уменьшение баллов по шкале NIHSS в сравнении с исходным состоянием, достижение mRS 0-2 балла на момент выписки пациента и на 90-сутки после операции.

**Результаты.** В группе пациентов, у которых выполнялся селективный артериальный тромболитика в острейшем периоде ишемического инсульта (до 2016 г.) успешным по ангиографическим и клиническим критериям лечение было у 8 пациентов из 11 (72,7%). В группе пациентов, которые лечились с острейшим ишемическим инсультом после 2016 года, у всех 23 пациентов по ангиографическим и клиническим критериям лечение было поначалу успешным. Однако 2 пациента умерли через неделю: в одном случае из-за декомпенсации кардиальной патологии, во втором - из-за реэмболии в базилярную артерию. В остальных наблюдениях исход был хорошим.

**Выводы.** Эндоваскулярные методы лечения ишемического инсульта в острейшем периоде имеют высокую эффективность.

**Keywords:** ишемический инсульт; острейший период; эндоваскулярное лечение; тромбэкстракция; стентирование