

# Охорона здоров'я дітей та підлітків

## Український міжвідомчий збірник

Збірник є правонаступником попереднього, заснованого в 1970 році.

Засновник — Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІОЗДП НАМН»).

## 1[33] 2022

ISSN 2519-2132 (online)  
ISSN 0369-8041 (print)

**ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я  
ДІТЕЙ  
ТА ПІДЛІТКІВ**

Засновано у 1970 році  
видається двічі на рік

**ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ**

Державна установа  
«Інститут охорони здоров'я дітей  
та підлітків Національної академії  
медичних наук України»

**АДРЕСА РЕДАКЦІЇ**  
ДУ «ІОЗДП НАМН»  
пр. Ювілейний, 52-А  
61153, м. Харків, Україна  
Тел. редакції:  
+38(0572) 62-31-27  
+38(050) 323-10-06

E-mail: journal@iozdp.org.ua  
<http://journal.iozdp.org.ua>

*Рекомендовано для розміщення через Інтернет та друку  
Вченого радиою ДУ «ІОЗДП НАМН»  
(протокол № 7 від 25.10.2022 р.)*

**Головний редактор:** Г. М. Даниленко  
(д-р мед. наук, професор, директор ДУ «ІОЗДП НАМН»)

**Заступник головного редактора:** В. О. Диннік  
(д-р мед. наук, заст. директора ДУ «ІОЗДП НАМН»)

**Відповідальний секретар:** М. Л. Водолажський  
(канд. мед. наук, заст. директора ДУ "ІОЗДП НАМН")

### **РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ**

Н. В. Багацька (д-р біол. наук, проф.), Л. Ф. Богмат (д-р мед. наук, проф.),  
Г. В. Кукуруза (д-р психол. наук), І. С. Лебець (д-р мед. наук, проф.),  
С. О. Левенець (д-р мед. наук, проф.), О. Ю. Майоров  
(д-р мед. наук, проф.), Е. А. Михайлова (д-р мед. наук),  
О. І. Плехова (д-р мед. наук, проф.), І. Л. Пую (д-р мед. наук),  
Л. К. Пархоменко (д-р мед. наук, проф.), Л. І. Рак (д-р мед. наук),  
С. І. Турчина (д-р мед. наук), Н. С. Шевченко (д-р мед. наук, проф.)

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 24678-14618Р  
від 29.10.2020 р.

Підписано до друку 28.10.2022 р.  
Формат - 60 x 84/8  
Папір офсет. Друк офсет.  
Ум. друк. арк. -  
Замовлення №  
Наклад 200 прим.

Відповідальність за зміст, добір та викладення фактів у статтях несуть автори, за  
зміст та оформлення інформації про лікарські засоби - замовники. Передрук опу-  
блікованих статей можливий за згоди редакції та з посиланням на джерело.  
Видання призначено для фахівців галузі охорони здоров'я.

# ЗМІСТ

РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ «КОМОРБІДНІСТЬ У ДІТЕЙ З РЕВМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ»

Монографія під редакцією Богмат Л. Ф., Шевченко Н. С. ..... 5

КОМОРБІДНІ СТАНИ ПРИ ОЖИРІННІ У ДІТЕЙ

Абатуров О. Є., Нікуліна А. О. ..... 9

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ ХЛОПЦІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 1 ТИПУ

Косовцова Г. В. ..... 13

ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ З ОЗНАКАМИ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Страшок Л. А., Бузницька О. В. ..... 17

# КОМОРБІДНІ СТАНИ ПРИ ОЖИРІННІ У ДІТЕЙ

Абатуров О. Є., Нікуліна А. О.

Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна

anna.nikulina.201381@gmail.com

**Мета дослідження:** виявити внесок коморбідних станів (порушення глікемії на тише/толерантності до вуглеводів, дисліпідемії, метаболічно-асоційованої жирової хвороби печінки (МАЖХП), артеріальної гіпертензії) у розвиток метаболічно нездорового ожиріння (*metabolically unhealthy obesity – MUO*) у дітей. **Матеріал і методи дослідження:** обстежено 210 дітей з ожирінням віком 6 – 18 років. Основну групу ( $n = 128$ ) представили діти з MUO згідно критеріїв IDEFICS 2014. Контрольну групу ( $n=82$ ) склали діти з метаболічно здоровим ожирінням (*metabolically healthy obesity – MHO*). Всім дітям було проведено загальноклінічне, імунообіхімічне дослідження з електрохемілюмінісценцією детекцією, ферментативно-колориметричного методу в сертифікованій лабораторії «Synevo» (Дніпро, Україна), сонографічне та біоімпедансометричне обстеження. Статичний аналіз включав варіаційний аналіз з розрахунком критерію Стьюдента ( $t$ ); послідовний аналіз Вальда з розрахунком відносного ризику (VR) і діагностичного коефіцієнта (DK); кореляційний аналіз Спірмена з розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена ( $\rho$ ). Критичне значення рівня статистичної значущості ( $p$ ) для всіх видів аналізу приймалося на рівні  $p < 0,05$  (5%). **Результати:** У пацієнтів з MUO порушення толерантності до вуглеводів реєструються у 26,7 %, дисліпідемія – у 53,3 %, МАЖХП – у 66,6 %, артеріальна гіпертензія – у 46,6 % випадків. Тоді як серед пацієнтів з MHO МАЖХП діагностуються у 10 % та дисліпідемія – у 5 % випадків. VR розвитку MUO в найбільшій мірі асоціюється з базальною гіперінсулінією (9,33); сонографічними критеріями печінкової гетерогенності за Saverymuttu (6,33); екстремальною ожирінням (6); співвідношенням ALT/AST  $\geq 1$  (3,56); сонографічними критеріями гепатомегалії (3,33); підвищеннем діастолічного (3,07) та систолічного артеріального тиску (2,27) та зниженням ліпопротеїдів високої щільності. **Висновки:** МАЖХП є найчастішим коморбідним станом, що зустрічається при різних фенотипах ожиріння у дітей.

**Ключові слова:** метаболічно нездорове ожиріння, метаболічно здорове ожиріння, порушення толерантності до вуглеводів, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, метаболічно-асоційована жирова хвороба печінки

## COMORBID CONDITIONS WITH OBESITY IN CHILDREN

Abaturov A., Nikulina A.

Dnipro State Medical University, Dnipro, Ukraine

**Background.** The unfavorable demographic situation in Ukraine is due to the spread of diseases of civilization (obesity, diabetes mellitus (DM), dyslipidemia, arterial hypertension, metabolically associated fatty liver disease) and requires early diagnosis, personalized treatment, and improvement of ways to prevent these diseases especially in childhood. About 15 million people die from non-communicable diseases every year. The mortality rate caused by the diseases of civilization is increased in a certain category of people who are included in the group of "high risk" regarding metabolic disorders. The aim of the study: to identify the contribution of comorbid conditions (impaired fasting glycemia/carbohydrate tolerance, dyslipidemia, metabolically-associated fatty liver disease (MAFLD), arterial hypertension) to the development of metabolically unhealthy obesity (MUO) in children. **Materials and methods.** 210 obese children aged 6-18 years were examined. The main group ( $n = 128$ ) were children with MUO according to the criteria of IDEFICS 2014. The control group ( $n = 82$ ) were children with metabolically healthy obesity (metabolically healthy obesity – MHO). All children underwent a general clinical, immunobiochemical examination with electrochemiluminescence detection, enzymatic colorimetric method in the certified laboratory "Synevo" (Dnipro, Ukraine), sonographic and bioimpedance examination. Static analysis included variational analysis with calculation of Student's test ( $t$ ); sequential Wald analysis with calculation of relative risk (RR); Spearman's correlation analysis by calculating the Spearman's rank correlation coefficient ( $\rho$ ). The critical value of the level of statistical significance ( $p$ ) for all types of analysis was accepted at the level of  $p < 0.05$  (5%). **Results:** In patients with MUO, violations of tolerance to carbohydrates are registered in 26.7 %, dyslipidemia – in 53.3 %, metabolic-associated fatty liver disease – in 66.6 %, arterial hypertension – in 46.6 % of cases. Whereas among patients with MHO, metabolic-associated fatty liver disease is diagnosed in 10 % and dyslipidemia in 5 % of cases. The relative risk of developing MUO is most associated with basal hyperinsulinemia (9.33); sonographic criteria of heterogeneity of liver tissue according to Saverymuttu (6.33); extreme obesity (6); ALT/AST ratio  $\geq 1$  (3.56); sonographic criteria of hepatomegaly (3.33); an increase in diastolic (3.07) and systolic blood pressure (2.27) and a decrease in high-density lipoproteins. **Conclusions:** The metabolic-associated fatty liver disease is the most frequent comorbid condition found in various phenotypes of obesity in children.

**Keywords:** metabolically unhealthy obesity, metabolically healthy obesity, impaired carbohydrate tolerance, arterial hypertension, dyslipidemia, metabolically associated fatty liver disease

## **ВСТУП**

Ожиріння у дітей, яке визначається Всесвітньою організацією охорони здоров'я, як надмірне накопичення жиру, що становить ризик для здоров'я, є глобальним захворюванням з потенційно руйнівними наслідками. Ожиріння в дитячому віці значно асоційоване з різноманітними коморбідними станами, а саме розладами вуглеводного обміну (порушенням толерантності до глюкози/глікемії натще, інсулінорезистентністю, цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, дисліпідемією, артеріальною гіпертензією, апніє уві сні, метаболічно-асоційованою хворобою печінки (МАЖХП), синдромом гіперандрогенії та синдромом полікістозних яєчників, протеїнурією й фокальним сегментарним гломерулосклерозом, раннім субклінічним атеросклерозом, порушеннями опорно-рухової системи (хворобою Блаунта, остеоартритом, спондилолістезом, епіфізелізом голівки стегнової кістки) та психіатричними розладами, ревматоїдним артритом та неалергічним ринітом [1-4].

Щорічно в світі від неінфекційних хвороб гине близько 15 млн осіб [5]. Серед дітей та підлітків з надлишковою масою тіла 19 % мають два або більше серцево-судинних факторів ризику, а 5 % — три або більше. При ожирінні вже 39 % дітей мають два або більше факторів кардіоваскулярного ризику, а 18 % — три або більше. При екстремальному ожирінні у 59 % дітей наявні два або більше, а у 33 % є три або більше серцево-судинних факторів ризику [6], що збільшують летальний наслідок у 2,57 рази (95 % CI; OR 2,41 – 2,74) порівняно з особами, що мають фізіологічну масу тіла [7].

Актуальність даної проблеми зумовлює мету нашого дослідження: виявити внесок коморбідних станів (порушення глікемії натще/толерантності до вуглеводів, дисліпідемії, МАЖХП, артеріальної гіпертензії) у розвиток МУО у дітей.

## **МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ**

Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри педіатрії № 1 та медичної генетики ДДМУ «Прогнозування розвитку дитячих захворювань, асоційованих з цивілізацією» (державний реєстраційний № 0120U101324).

Клінічне обстеження пацієнтів під час стаціонарного лікування на базі дитячого ендокринологічного відділення КНП «Дніпровська МКЛ № 9» ДМР» проведено у відповідності до Гельсінської декларації. Перелік додаткових параклінічних методів обстеження був складений згідно до Наказу МОЗ України від 24.09.2022 № 1732 «Про затвердження Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей». Для верифікації коморбідних станів, асоційованих з ожирінням у дітей ми застосовували рекомендації Європейського суспільства ендокринологів та Дитячого ендокринологічного суспільства [8].

Антропометричні вимірювання проводили у ди-

тини в білизні та без взуття. Зріст (см) вимірювали за допомогою Heightronic Digital Stadiometer® з точністю до 0,1 см. Масу тіла (кг) вимірювали за допомогою аналізатора складу тіла Tefal Bodysignal (Франція). Систолічний і діастолічний артеріальний тиск (САТ та ДАТ) вимірювали за допомогою цифрового осцилограметричного пристрою Dinamap ProCare (GE Healthcare).

Матеріалом для імунобіохімічного обстеження була венозна кров. Для вивчення порушення вуглеводного обміну визначали рівень базальної глікемії та інсулінемії імуноХімічним методом тестування з електрохемілюмінісценцією (ECLIA). Підвищення інсулінорезистентності відзначалося при гіперінсулінемії > 95-й процентиль відповідно до процентильних кривих, рекомендованих консорціумом IDEFICS 2014 для європейської популяції відповідно до віку та статі дитини [9].

Для вивчення порушень ліпідного обміну визначали рівень ліпопротеїдів високої щільноти (ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ) ферментативно — колориметричним методом із використанням наборів фірми Roche Diagnostics (Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000. Дослідження рівнів аланінаміотрансамінази (АЛТ) і аспартатаміотрансамінази (АСТ) проводили кінетичним методом і оцінювали згідно з рекомендаціями NASPGHAN [10]. Додатково в групах порівняння оцінювали біохімічні маркери (індекс співвідношення АСТ/АЛТ, де показник більше 1 вважався патологічним).

Всім дітям проводилося ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, нирок, наднирників, щитоподібної залози за допомогою апарату Simens Sonoline G 40 (Японія) з використанням конвекційного датчика з частотою 2,5 – 5 МГц.

Статичний аналіз включав варіаційний аналіз з розрахунком критерію Стьюдента (t); послідовний аналіз Вальда з розрахунком відносного ризику (ВР); кореляційний аналіз Спірмена з розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (ρ). Критичне значення рівня статистичної значущості (p) для всіх видів аналізу приймалося на рівні p < 0,05 (5 %).

## **РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ**

Середній вік пацієнтів в основній групі становив  $13,63 \pm 0,4$  років, тоді як у контрольній групі —  $11,95 \pm 1,6$  років, p > 0,05. Доля хлопчиків в основній групі склала 40 % (51/128), в контрольній групі — 50 % (41/82). У зв'язку з чим, відносний ризик МУО у дівчаток є у 1,2 рази вище, ніж у хлопчиків, p < 0,05.

У пацієнтів з МУО порушення толерантності до вуглеводів діагностуються у 26,7 %, дисліпідемія — у 53,3 %, МАЖХП — у 66,6 %, артеріальна гіпертензія — у 46,6 % випадків. Тоді як серед пацієнтів з МНО МАЖХП та дисліпідемія діагностуються у 10 % та 5 % випадків відповідно. МАЖХП є найпоширенішим коморбідним станом, що за нашими даними реєстру-

ється частіше у дівчаток (50 %) та рідше у хлопчиків (33 %) з різними фенотипами ожиріння ( $p < 0,05$ ), на відміну від результатів попередніх досліджень, в яких частіше МАЖХП виявлялась у хлопчиків [11].

В основній групі найбільш зустрічаємою клінічною асоціацією з МАЖХП було поєднання абдомінального ожиріння, дисліпідемії та артеріальної

гіпертензії (33,3 %), наявність чотирьох маркерів ускладненого перебігу ожиріння відзначалося у кожного п'ятого пацієнта з МУО (20 %). Гіперглікемія була діагностована лише в основній групі в асоціації абдомінального ожиріння з дисліпідемією (6,7 %) або у поєднанні з абдомінальним ожирінням та артеріальною гіпертензією (6,7 %), рис. 1.




Рисунок 1. Маркери ускладненого перебігу ожиріння у дітей, асоційованого з МАЖХП.

Поширеність серцево-судинних факторів ризику збільшується зі зростанням маси тіла ( $\rho = 0,59$ ); IMT ( $\rho = 0,59$ ); наявністю екстремального ожиріння ( $\rho = 0,47$ ); гепатомегалії при ультразвуковому обстеженні ( $\rho = 0,45$ ); порушення глікемії натоще ( $\rho = 0,44$ ); окружності талії ( $\rho = 0,43$ ); окружності стегон ( $\rho = 0,43$ ); порушенням толерантності до вуглеводів ( $\rho = 0,35$ ); зростом ( $\rho = 0,3$ ); артеріальною гіпертензією ( $\rho = 0,28$ ) і віком ( $\rho = 0,28$ ) та зменшується при співвідношенні АСТ/АЛТ  $< 1$  ( $\rho = -0,37$ ).

Ризик розвитку прогредієнтного перебігу МУО за наявності МАЖХП в найбільшій мірі асоціюється з базальною гіперінсулінією (ВР = 9,33); сонографічними критеріями печінкової гетерогенності за Saverymuttu (ВР = 6,33); екстремальним ожирінням (ВР = 6); співвідношенням АЛТ/АСТ  $\geq 1$  (ВР = 3,56); гепатомегалією (ВР = 3,33); підвищеннем ДАТ (ВР = 3,07) та САТ  $\geq 90$ -й процентиль (ВР = 2,27) та зниженням ЛПВІЩ  $\geq 25$ -й процентиль (ВР = 1,87).

Дані попередніх авторів також демонструють підвищення кардіоваскулярного ризику в осіб зі збільшенням IMT, абдомінальним та екстремальним ожирінням, але на відміну від нашої роботи не містять інформації щодо прогнозування ризику МУО серед дітей [8, 12].

## ВИСНОВКИ

Метаболічно нездорове ожиріння діагностується в 1,2 рази частіше серед дівчаток, ніж у хлопчиків.

МАЖХП є найпоширенішим коморбідним станом при різних фенотипах ожиріння у дітей віком 6-18 років.

Ризик розвитку прогредієнтного перебігу МУО за наявності МАЖХП збільшується при гіперінсулінії в 9 разів; при сонографічних даних печінкової гетерогенності за Saverymuttu — в 6,33 рази; при екстремальному ожирінні — в 6 разів; при співвідношенні АСТ/АЛТ  $\geq 1$  — в 3,56 рази; при гепатомегалії — в 3,33 рази; при підвищенні ДАТ — в 3,07 рази; при підвищенні САТ — в 2,27 рази та при зниженні рівня ЛПВІЩ — в 1,87 рази.

Враховуючи значний внесок МАЖХП при МУО серед дітей, перспективним етапом нашої науково-дослідної роботи стане визначення вкладу генів-кандидатів в її розвиток.

Конфлікт інтересів: автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів.

## **БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ**

1. Smith JD, Fu E, Kobayashi MA. Prevention and Management of Childhood Obesity and Its Psychological and Health Comorbidities. *Annu Rev Clin Psychol.* 2020;16:351-378. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-100219-060201
2. Lonardo A, Mantovani A, Lugari S, et al. Epidemiology and pathophysiology of the association between NAFLD and metabolically healthy or metabolically unhealthy obesity. *Ann Hepatol.* 2020;S1665-2681(20)30023-5. doi: 10.1016/j.aohep.2020.03.001
3. Abaturov A, Nikulina A. Genotype C/C 13910 of the Lactase Gene as a Risk Factor for the Formation of Insulin-Resistant Obesity in Children. *Acta Medica (Hradec Kralove).* 2019;62(4):150-155. doi: 10.14712/18059694.2020.4
4. Sagar R, Gupta T. Psychological Aspects of Obesity in Children and Adolescents. *Indian J Pediatr.* 2018;85(7):554-559. doi: 10.1007/s12098-017-2539-2
5. Davies MJ, Aroda V, Collins BS et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetologia.* 2022. doi: 10.1007/s00125-022-05787-2
6. Ruiz LD, Zuelch ML, Dimitratos SM, et al. Adolescent Obesity: Diet Quality, Psychosocial Health, and Cardiometabolic Risk Factors. *Nutrients.* 2019;12(1):43. doi: 10.3390/nu12010043.
7. Kumar S, Kelly AS. Review of Childhood Obesity: From Epidemiology, Etiology, and Comorbidities to Clinical Assessment and Treatment. *Mayo Clin Proc.* 2017;92(2):251-265. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.09.017
8. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2017;102(3):709-757. doi: 10.1210/jc.2016-2573
9. Peplies J, Jiménez-Pavón D, Savva SC, et al. IDEFICS consortium. Percentiles of fasting serum insulin, glucose, HbA1c and HOMA-IR in pre-pubertal normal weight European children from the IDEFICS cohort. *Int J Obes (Lond).* 2014 Sep;38 (2):39-47. doi: 10.1038/ijo.2014.134
10. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, et al. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: Recommendations from the Expert Committee on NAFLD (ECON) and the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN). *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2017;64(2):319-334. doi: 10.1097/MPG.0000000000001482
11. Lee KJ, Moon JS, Kim NY, et al. Effects of PNPLA3, TM6SF2 and SAMM50 on the development and severity of non-alcoholic fatty liver disease in children. *Pediatr Obes.* 2022;17(2):e12852. doi: 10.1111/ijpo.12852
12. Ruiz LD, Zuelch ML, Dimitratos SM, et al. Adolescent Obesity: Diet Quality, Psychosocial Health, and Cardiometabolic Risk Factors. *Nutrients.* 2019;12(1):43. doi: 10.3390/nu1201004